

Drain Jackson-Pratt

Directives postopératoires

Le drain Jackson-Pratt permet d'évacuer le liquide de votre plaie

Vérification du drain

- La première journée, vérifiez le drain toutes les quatre heures. Videz la poire lorsqu'elle est à moitié pleine.
- Le deuxième jour, videz la poire aux huit à douze heures.
- La couleur des liquides peut varier (rouge foncé, rose, jaune et même transparente).

Vidage du drain

- Chaque fois que vous videz la poire pendant les 7 premiers jours, notez la quantité de liquide sur une feuille. Amenez cette feuille avec vous lors de votre prochain rendez-vous.



- Si la poire est pleine de liquide, videz le contenu dans le lavabo.
- Après avoir vidé la poire, remettez le capuchon tout en tenant la poire écrasée pour qu'il y ait une succion continue.

Si la poire est complètement ronde, le drain ne fonctionne pas, car il n'y a pas de succion.

- Si la poire est pleine d'air, écrasez-la pour faire sortir l'air, puis remettez le capuchon en place.

Emplacement du drain

- Une épinglette est utilisée pour fixer le drain sur vos vêtements.
- Assurez-vous que le drain est placé plus bas que la plaie pour permettre un meilleur débit.

Communiquez avec votre médecin ou rendez-vous à l'Urgence la plus près si vous :

- percevez des rougeurs ou de l'enflure à l'incision;
- ressentez des douleurs intenses à l'incision qui ne peuvent être soulagées par la médication;
- constatez que le tube de drainage et/ou la poire sont craqués ;
- remarquez que les liquides sont embrouillés, de couleur beige;
- remarquez une odeur nauséabonde;
- avez de la fièvre ou des frissons;
- constatez que le drain se remplit rapidement de sang rouge clair;
- remarquez que les points de suture sont brisés; et/ou
- voyez que le drain n'est plus en place.