

# Instructions postopératoires

## Cholécystectomie Laparoscopique

Suivez les directives spécifiques de votre chirurgien si elles diffèrent des énoncés suivants.

### Le retour à la maison

#### Les pansements (Opsite<sup>MC</sup>):

- Gardez-les pendant trois jours.
- Vous pouvez prendre une douche.
- Aucun bain ou baignade n'est permis dans les quatorze jours suivant l'opération



#### Les petits pansements blancs sous le pansement primaire (Stéri-strips<sup>MC</sup>):

- Gardez-les directement sur la peau durant sept jours.
- Si un petit pansement tombe durant votre douche, il n'est pas nécessaire de le remplacer.
- S'il y a des points de suture, ceux-ci vont se dissoudre graduellement.

#### Diète :

- Consommez des liquides clairs pour le premier repas et reprendre votre diète normale par la suite à moins d'avis contraire de votre chirurgien.

#### Les activités physiques

- Vous pouvez marcher.
- Vous pouvez monter des escaliers.
- Aucun sport n'est permis.
- Ne soulevez aucun objet de plus de dix livres durant les deux à six semaines suivant la chirurgie ou selon les directives de votre chirurgien.
- Ne conduisez pas votre véhicule durant la semaine qui suit la chirurgie ou jusqu'à ce que vous cessiez de prendre des médicaments contre la douleur.

#### Le contrôle de la douleur et la prévention de la constipation

- Prenez régulièrement les médicaments prescrits ou prenez du Tylenol<sup>MC</sup> et de l'Advil<sup>MC</sup>.
- Il est normal de ressentir de la douleur aux épaules pendant les 48 à 72 heures qui suivent la chirurgie.
- Prenez du jus de pruneaux et/ou du Metamucil<sup>MC</sup>.
- Si cela n'est pas efficace, prenez une cuillère à soupe de lait de magnésie par jour ou du PEG 3350 (polyethylene glycol) comme Restoralax, Lax-ad-ay ou Clearlax jusqu'à ce que vous alliez à la selle.

#### Communiquez avec votre médecin ou rendez-vous à l'Urgence la plus près si vous :

- avez des rougeurs, des chaleurs;
- remarquez un durcissement (induration) ou des écoulements (autre que du sang) au niveau des incisions;
- faites de la température ou avez des frissons;
- ressentez une intensification de la douleur;
- avez de la douleur et de la chaleur au mollet;
- vomissez;
- êtes soudainement essoufflé.

**N.B. Il est normal pour les femmes d'avoir des menstruations irrégulières dans les semaines qui suivent l'anesthésie générale.**

#### Prochain rendez-vous :

Date :

Heure :

#### Pour prendre un rendez-vous, communiquez avec le bureau de votre chirurgien.

L'information pour le bureau vous a été remise avec vos instructions de congé.

Un avis de 24 heures est nécessaire pour annuler un rendez-vous.

713, chemin Montréal Ottawa (Ontario)

T 613.746.4621

[hospitalmontfort.com](http://hospitalmontfort.com)

5100267 (25-05)