

Drain Jackson-Pratt

Instructions postopératoires

Suivez les directives spécifiques de votre chirurgien(ne) si elles diffèrent des énoncés suivants.


Le drain Jackson-Pratt permet d'évacuer le liquide de votre plaie. Cela prévient l'infection et accélère la guérison

Vérification du drain :

- La première journée, vérifiez le drain toutes les quatre heures. Videz la poire lorsqu'elle est à moitié pleine.
- Les jours suivants, videz la poire deux ou trois fois par jour, où lorsqu'elle est à moitié pleine.
- La couleur des liquides peut varier (rouge foncé, rose, jaune et même transparente).


Vidage du drain

1. Lavez vos mains avant de vider le drain.
2. Ouvrez le bouchon et videz le contenu de la poire dans le contenant gradué qui vous a été fourni. Pour éviter de contaminer le drain, ne touchez pas l'intérieur du capuchon ou de la poire.
3. Chaque fois que vous videz la poire pendant les sept premiers jours, notez la quantité de liquide et la date sur une feuille. Amenez cette feuille à votre prochain rendez-vous.
4. Videz le liquide dans la toilette ou le lavabo.
5. Écrasez la poire et ensuite remettez le capuchon afin d'activer la succion.
6. Si la poire est complètement ronde, le drain ne fonctionne pas, car il n'y a pas de succion. Enlevez le capuchon, écrasez la poire pour faire sortir l'air, puis remettez le capuchon en place.



Traire le drain

Si des résidus bloquent le flux du liquide: Tenez fermement le tube près du site où il rentre dans votre peau. Avec le pouce et l'index de l'autre main, pincez le tube. Glissez le pouce et l'index le long du tube pour pousser les fluides vers la poire et débloquent le tube. Attention de ne pas tirer sur le drain.



Emplacement du drain

- Une épinglette est utilisée pour fixer le drain sur vos vêtements. Portez des vêtements amples pour éviter de serrer le tube.
- Assurez-vous que le drain est placé plus bas que la plaie pour permettre un meilleur drainage.

Communiquez avec votre médecin ou rendez-vous à l'Urgence la plus près si vous :

- ressentez des douleurs intenses à l'incision qui ne peuvent être soulagées par la médication;
- constatez que le tube de drainage et/ou la poire sont craqués;
- remarquez que les liquides sont embrouillés, de couleur beige;
- remarquez une odeur nauséabonde;
- avez de la fièvre ou des frissons;
- constatez que le drain se remplit rapidement de sang rouge clair;
- voyez que du liquide s'écoule d'autour du site d'insertion du drain;
- remarquez que les points de suture sont brisés; et/ou
- voyez que le drain n'est plus en place.