

# Instillation vésicale de mitomycine<sup>MD</sup>

## Qu'est que la mitomycine<sup>MD</sup>?

La mitomycine<sup>MD</sup> est un médicament utilisé pour traiter le cancer de la vessie. C'est un liquide bleu ou violet clair. Il est inséré dans la vessie au moyen d'un petit tube appelé cathéter urinaire.

## Qu'est-ce qu'une instillation?

Une instillation signifie l'insertion du médicament directement dans votre vessie.

## Pourquoi la mitomycine<sup>MD</sup> est-elle nécessaire?

Insérer la mitomycine<sup>MD</sup> directement dans la vessie est une méthode utilisée pour traiter le cancer de la vessie. Elle élimine, ralentit ou arrête la croissance de cellules cancéreuses dans la vessie.

Cette procédure est habituellement faite sur une base ambulatoire et, souvent, vous n'avez pas besoin de passer la nuit à l'hôpital.

## Comment la mitomycine<sup>MD</sup> est-elle administrée?

Dans la salle d'opération, votre chirurgien ou chirurgienne insérera un cathéter urinaire dans votre urètre (l'ouverture par laquelle votre urine passe). Dans la salle de réveil, le personnel infirmier instillera la mitomycine<sup>MD</sup> dans votre vessie par le biais du cathéter urinaire.

Le cathéter urinaire reste dans votre vessie pendant **au moins** deux heures.

- Lorsque vous êtes prêt ou prête pour la procédure, le cathéter sera fermé de façon à ce que le médicament reste dans votre vessie;
- On vous demandera de changer de position plusieurs fois durant la procédure (toutes les 15 minutes) pour aider le médicament à atteindre toutes les parties de votre vessie. Le personnel infirmier vous aidera et veillera à ce que vous soyez confortable;
- Après cela, le cathéter urinaire sera ouvert pour permettre au médicament et à l'urine de couler dans la poche de drainage;
- Le personnel infirmier retirera ensuite le cathéter urinaire suivant la prescription du chirurgien ou de la chirurgienne.

**Remarque :** L'infirmière ou infirmier et le chirurgien ou la chirurgienne porteront de l'équipement de protection individuelle (qui peut comprendre des gants, un masque doté d'une visière et une blouse de chirurgien) lorsqu'ils manipulent le médicament mitomycine<sup>MD</sup> et/ou des fluides corporels.

## Instructions relatives au congé de l'hôpital

Vous pouvez ressentir des spasmes de la vessie ou une sensation de brûlure ou éprouver de petits saignements quand vous urinez pendant jusqu'à une semaine après le traitement;

Buvez beaucoup de liquides pendant au moins 6 heures après le retrait du cathéter urinaire;

- Videz votre vessie souvent, puisque cela aide à prévenir les problèmes de vessie;
- Dans chaque situation, assurez-vous de vous asseoir lorsque vous urinez (pendant au moins 72 heures après le traitement) pour minimiser les éclaboussures d'urine à l'extérieur du bol de toilette. Assurez-vous de fermer le couvercle du siège de toilette avant de tirer la chasse d'eau. Il faut tirer la chasse d'eau à 2 reprises après avoir uriné.;

- Pendant 72 heures après avoir reçu la mitomycine<sup>MD</sup>, assurez-vous de bien vous laver les mains et les parties génitales avec du savon et de l'eau chaude après être allé à la toilette;
- Si vous employez une salle de bain commune/ publique, utilisez des lingettes désinfectantes / Clorox pour nettoyer les surfaces après chaque utilisation pendant une période d'au moins 72 heures;
- Changez vos vêtements souillés par de l'urine. Lavez les vêtements, la literie et les articles de toilette qui peuvent avoir été en contact avec votre urine dans de l'eau chaude savonneuse;
- Vous devriez éviter de boire de l'alcool pendant au moins 24 heures;
- La mitomycine<sup>MD</sup> peut endommager le sperme et avoir des effets négatifs si elle est utilisée pendant la grossesse. Par conséquent, c'est mieux d'utiliser des méthodes de contraception pendant son traitement avec ce médicament;
- Ne pas allaiter durant le traitement.

## Quels sont les effets secondaires?

- **Effets fréquents :** Sensation de brûlure en urinant, envie d'uriner plus fréquente ou légère irritation de la peau pendant jusqu'à 48 heures.
- **Effets graves (appelez votre chirurgien ou rendez-vous au Service d'urgence) :** Douleur intense lorsque vous urinez, incapacité à uriner, présence de sang dans votre urine, douleurs abdominales, fièvre (plus de 38°C ou 100,4°F) ou frissons qui durent plus de 24 heures, ou éruptions cutanées importantes sur vos parties génitales.